



Origen: Este de Asia, Japón, Corea y China.

Hábitat: Riberas fluviales y cunetas húmedas.

Status: No presente aún en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Modo de introducción: Cultivada con fines ornamentales. Introducida en Gran Bretaña en 1825 y desde aquí expandido por toda Europa y Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia.

Características: produce grandes rizomas que pueden llegar hasta los 15 mt. de la planta madre y 2 m. de profundidad. Esto le permite competir con ventaja frente a las plantas nativas es mas eficaz en el aprovechamiento de los recursos hídricos y los nutrientes del suelo. Cualquier fragmento de sus rizomas superiores aun gramo de peso son capaces de regenerar una nueva planta.

A partir de abril los brotes nacen con una tasa de crecimiento espectacular (hasta 8 cm/día). En pocos días forma una masa monoespecífica. En las riberas fluviales desplaza la vegetación y fauna nativa, alterando notablemente la dinámica del ecosistema. Puede provocar graves daños económicos al obstruir los desagües de ríos y dañar las construcciones y obras públicas. Sus tallos llegan incluso a atravesar el asfalto y destruir tuberías. Está catalogada como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo por la UICN.